

Сув ресурсларидан
мукаммал
фойдаланиш


Мавзу: Гидросфера, уни пайдо булиши, шаклланиши, ундаги сувнинг турлари ва захиралари


Режа:

1. Ерда сувни пайдо булиши хакидаги гипотезалар (фаразлар);
2. Ернинг сувли кобигини шаклланиши;
3. Гидросферадаги сувни турлари ва захиралари.


Ерда сув кандай пайдо булган?

Сайёрамизда сувнинг келиб
чикиши хакида **ягона** тан
олинган **назария йўқ**, лекин
бир неча фаразлар
мавжуд





m



1. Jahon okeanining chizig'i
2. Yer ellipsoidi

3. Tik chiziqlar,
4. Yer tanasining relyefi
5. Geoid

1 Yer qobig'i

Er qobig'ining qaliligi 1

40 dan 80 km gacha

uning asosiy tarkibiy

elementlari:

kislород, kremniy

va alyuminiy.

5 Ichki


yadro - bu

temir, nikel va boshqa

konchilarning

radiusi taxminan

1300 km bo'lgan qattiq shar.



4 Tashqi yadro

bu radiu-som suyuq

temir - nikel qobig'i bo'lib,
taxminan 3430 km.

2 Yuqori

mantiya

Yuqori

mantiyaning

qaliligi, pastki

mantiya va yarim qobiq

orasidagi bo'shliq - taxminan

980 km.

3 Pastki

mantiya

pastki mantianing

qaliligi

1920 km. uning asosiy

tarkibiy elementlari:

krem \ u200b \

u200b, magniy,

kislota jinsi, temir,

kaliy va alyuminiy.

Ерда сувнинг пайдо булиши хакида биринчи фараз

1 – фараз, Ери "иссик" холда пайдо бўлиши холатидан келиб чикади. Ер бир вактлар ўта юкори хароратга эга шар бўлиб, **секин-аста совий** бошлаган. Шунда юза қисмида **бирламчи пўстлок пайдо бўлган, кимёвий элементларнинг бирикмалари вужудга келган** ва ер устида **водород хамда кислороднинг бирикмаси, яъни – сув вужудга келади.**

Совиётган ер пўстлоғи ёриклиаридан отилиб чикаётган газлар ер атрофидаги **бўшликни тобора тўлдира бошлади.** Бу **газлар ва буғлар совиши** жараёнида ер планетасини қуюқ ўраб олган **булутли копламани ташкил қиласи.** Хароратни пасайиши маълум даражага етганда, **булутлардаги намлик сувга айланаб биринчи ёмғирлар** ёғиб ўтади. Шу аснода **минг йиллар давомида** шу **ёмғирлар суви** ер юзасидаги **чукурликларни аста-секин тўлдириб дунё океанини вужудга келтириди.**



Ерда сувнинг пайдо бўлиши ҳақида иккинчи фараз

■ Иккинчи-фараз - Ернинг дастлаб «совуқ» холда бўлиб кейинчалик қизишидан келиб чикади. Ери қизиши вулкан харакатларини вужудга келишига сабаб бўлган. Вулканлардан отилиб чиқаётган "лава" планета юзасига катта миқдорда сув буғларини ҳам олиб чиқади. Бу сув буғларининг бир қисми конденсация жараёнида сувга айланиб океан чукурликларини тўлдирди, қолган қисми эса атмосфера ҳавосини ва ундаги намликни вужудга келтирди.

Бу фаразга асосан, сув - ерни ташкил қилган бирламчи материя таркибида бўлган дейилади, ерга тушаётган метеоритлар таркибида сувни борлиги эса бу фикрни тасдиғи сифатида қаралади.

Ерда сувнинг пайдо бўлиши ҳақида

учинчи фараз

- Учинчи фараз хам ерни бирламчи "совук" холда пайдо бўлиши ва кейинчалик қизишига асосланади. Ерни қизиб бориш жараёнида 50-70 км чукурликда ер мантиясида водород ва кислород ионларидан сув буғлари пайдо бўла бошлаган. Юкори катламларни катта босими таъсирида сув буғлари мантиянинг юқори қатламларига ва ер пўстлоғига сиқиб чиқарилган. Ер пустлогидаги паст ҳарорат сув буғлари билан минераллар орасида кимёвий реакциялар юз беришига ва натижада тоғ жинслари юмшашига, унда дарзликлар ва ғоваклар пайдо бўлишига олиб келган. Дарзлар ва ғоваклар сув билан тулган, сувнинг босими таъсирида дарзликлар кенгайиб синикларга (разломларга) айланган хамда синиклар оркали сув ер юзасига кутарилиб бирламчи океанлар пайдо булган.
- **Иссиқ сув пўстлоқдаги кислота ва ишқорларни осонгина эритади ва бу қоришима атрофдаги хамма нарсаларни емириб секин-аста намокобга айланади яъни шўр сувлар пайдо бўлади.** Намокоб қитъаларни гранит асоси остида ён томонга ва чукурликка кенгайиб боради. Гранитни ғовакли структураси фильтр каби намокобдаги сузуб юрувчи металларни ушлаб колган. Лекин секин-аста "фильтр" ифолосланиб экран сифатида сувни утказмайдиган тўсиққа айланган.

Ерда сувниңг пайдо бўлиши ҳақида тўртинчи фараз

Туртинчи фаразда сувни **космик йўл билан пайдо бўлган деб** фараз килинади. Маълумки **ерга космосдан узлуксиз** равишда электр зарядли заррачалар ёғади ва бу заррачаларнинг катта **кисмини водород атомининг ядроси – протонлар ташкил** этади. Атмосферани юкори катламларини ёриб ўтган **протонлар хаводаги** **электронларни бирлаштириб** водород атомига айланади ва **атмосфера кислороди билан** **реакцияга** киришиб **сув молекулаларини хосил** киласди.

Хисоб бўйича, **космос йилига 1,5 тонна** микдорида сув бериш имкониятига эга ва бу сувлар ёгин сифатида ер юзасига тушади. Йилига бир ярим тонна глобал ўлчамда – жуда кичик микдордир. Лекин, сувни космик йўл билан шаклланишини планетани пайдо бўлиши билан бир вактда яъни **5-7 миллиард** йил илгари бошланганлигини назарда тутиш керак.

Ерда сувнинг пайдо бўлиши ҳақида бешинчи фараз

- Бешинчи фараз. Ернинг ярим шарлар харитасида Америка қитъаларининг қирғоқ чизиқлари билан Африка ва Евро-Осиё қитъаларинг қирғоқ чизиқларининг ғаройиб ўхшашлиги;
- **250 миллион йил аввал Ерда ягона яхлит қитъа бўлган.** Кейин, номаълум сабабларга кура у дарс кетган ва унинг кисмлари бир-биридан узоклаша бошлаган. Китъани бир вактлар яхлитлилигини улардаги фауна ва флора хамда киргокларни геологик структураларини ухшашлиги хам тасдиклайди.
- Таажжуб; **қандай қилиб илдизлари бир неча ўн километрлар чукурликда бўлган қитъалар бўлаклари бир-бирларидан узоклашишлари мумкин?** ва нима уларни харакатга келтиради?
- Сунгги йиллар тадқикотлари тасдиклади: **ха, қитъалар "сузаяптилар", улар орасидаги масофа доимий кўпаймокда.** Китъаларни (харакатини) силжишини ерни кенгайиш гипотезаси билан тушинтириш мумкин.
- Гипотеза таъкидлайди: **бирламчи ер хозиргига нисбатан (бир мунча) икки марта кичик радиусга эга булган.** Ўшанда ягона яхлит булган китъалар планетани хар томондан ўраб олган. Океанлар бўлмаган.



Ерда сувнинг пайдо бўлиши ҳақида бешинчи фарааз

- Протеразой ва мезазой чегарасида (**250-300 млн. йил илгари**) ер кенгая бошлади. Ягона яхлит китъа дарз кетди, дарзлар сув билан тулиб океанларга айланди. Хозирги давргача ерни радиуси икки марта узайди! Улчовлар планетани кенгаяётганини курсатади!
- Планета нега кенгаймокда?
- Маълумки коинот атомлар сони буйича **98%** водороддан ташкил топган. Ер хам атомлар сони буйича **98%** водороддан ташкил топган. Күёш тизимидағи планеталар каби **ерга хам совук космик чанглар заррачалари кириб келган**. Бу заррачалар орасида эса **металлар** хам бўлган.
- Маълум бўлишича, **металлар ўзларини хар бир хажмига – ўн, юз ва хаттоқи минг баробар кўп хажмда водород ютиш хоссасига эга** экан. Металл канчалик кўп микдорда **водородни бирлаштириб олса, у шунчалик ихчамлашар** экан, яъни уз хажмини кичрайтирад экан. Бошка металларга келсак (масалан, темир, никел) улар 1 кгс/см² кучдаги нормал босимда ўз хажмини деярлик ўзгартирмайди.

Ерда сувнинг пайдо бўлиши ҳақида бешинчи фараз

- Планетани марказий кисми энг катта сиқилишни сезганлиги учун ана шу кисмидаги (ядрода) ҳарорат шунчалик юкори кўтарилиган. Ер ядросидаги ҳарорат критик қийматига етганда (балким бизга маълум бўлмаган бошқа омиллар аралашувида) **металдан водородни ажралиб чикиш** – яъни тескари жараён бошланган. Метал водород бирикмасини бўлиниши, яъни металлик структурани тикланиши, Ер ядроси хажмини кескин ўсишини вужудга келтирган. Металли ядрони кенгайишида шундай куч юз берганки хатто планетани мантияси ва пустлаги бардош беролмай дарз кетган.
- **Водород дегазацияси** (водород газини ажралиб чикиши) Ерни кенгайиши билан (давом этган) юз берган. Ажралиб чикаётган водород планетани жуда калин қатламларини ўтиб йўл-йўлакай ўзига кислородни бириктирган хамда ер юзасига сув буғлари сифатида отилиб чиқкан. Хавода сув буғлари конденсацияланиб ер кенг ёрикларини тўлдириган ва аста-секин океанлар пайдо булган.

Шундай қилиб ерда сувни пайдо булиши ҳақидаги бешта фараз билан танишдик. **Хозирча "Ерда сув кандай пайдо булган?"** деган савол очиклигича қолмокда.

Ерда сув қандай пайдо бўлган?

- Табиатда сув ерни сайёра сифатида шаклланиш даврида содир бўлган физикавий ва кимёвий (моддаларни массаси буйича саралashi ва узаро кимёвий бирикиш) жараёнлари натижасида хосил булган.
- Бир неча миллиард йил илгари Ерда эркин холдаги (богланмаган) сувлар булмаган. Кейинчалик – 4 млрд. йил илгари – ернинг сув кобигининг хажми бор-йуги 20 млн. км³ ни ташкил килган, яъни хозиргидан 7000 марта кам булган (Клиев, 1982).
- Сув кобигининг пайдо бўлиши ва шаклланиш жараёни узок муддат давом этган ва у ер мантиясини дегазацияси хисобига юз берган. Бу жараён хозирги даврда хам давом этмокда. Ерда сувни пайдо булишини таъминловчи манба мантияни сув хажми 20 млрд. км³ микдорда баҳоланган (Виноградов, 1963) еки у гидросфера умумий хажмидан 15 марта катта.
- Баъзи бир тасаввурлар буйича мантияни дегазацияси хисобига гидросфера хажми йилига 1км³ га якин кўпаяркан. Олимлар тахминича бу жараёнлар деярли 5 млрд йил мукаддам асосан тугаган ва натижада сайёрамиздаги сув захиралари (1-жадвал) хосил бўлган.

Ернинг сув қобиғи - гидросферанинг шаклланиши

Ер сиртиниң океанлар ва денгизлар сувлари билан копланган юзаси умумий ном билан Дунё океани деб аталади. У планетамизниң сув қобиғи булган гидросферанинг ажралмас ва асосий кисмидир.

Гидросфера Дунё океанидан ташкари курукликтаги дарёлар, куллар, океанлар ва музликлардан, атмосферадаги сув буги, тупрокдаги намлик ва ер ости сувларидан ташкил топган.

Дунё океани ер куррасини умумий майдонини (510 млн.кв.км.) 361 млн.кв.км.ни ёки 71%-ни эгаллаган, курукликлар юзаси эса 149 млн.кв.км., ёки уни 29%-ни ташкил этади.

Курикликтаги барча ички сув хавзалари майдонининг йигинди унинг умумий майдонини 3 фоизидан камротини, музликлар эса тахминан 10 фоизини ташкил этади.

Ер гидросферасининг турли кисмларидаи сув хажми

Гидросфера кисмлари	Сув хажми минг км³	Умумий хажмга нисбатан % хисобида	Чучук сувлар хажмига нисб. % хисобида
Дуне океани	1370323	93,93	
Ер ости сувлари (чукур катламларда шур сув)	60000	4,12	
Чучук ер ости сувлари (фаол янгиланувчи зона)	4000	0,27	14,1
Музликлар	24000	1,65	84,6
Куллар	278	0,019	0,97
Тупрок намлиги	83	0,006	0,28
Атмосфера сув буглари	14	0,001	0,05
Дарёлар	1,2	0,0001	0,004
Ж А М И	1458699	99,9961	100,0

Ер шарининг сув баланси (М.И.Львович буйича)

Ер шарини кисмлари	Майдо- ни млн km^2	Ёгинлар		Бугланиш		Оким	
		Минг km^3	Мм	Минг km^3	Мм	Минг km^3	Мм
Дунё океани	361	413	1140	453	1254	41	114
Курукликни этак кисми	107	106	910	65	560	41	350
Курукликни юкори кисми	42	75	238	75	238	-	-
Куруклики хаммаси	149	181	1148	140	798	41	350
Ер шари	510	525	1030	525	1030	-	-

	Сув балансининг элементлари	Европа	Осиё	Африка	Шимол. Америка	Жануб. Америка	Австр алия	Бутун курукл ик ^{x)}
	Майдон, млн. км ²	9.8	45.0	30.3	20.7	18.4	8.7	132.3
Мм	Ёгиллар, Е	734	726	686	670	1684	736	834
Мм	Дарё оқими: - тулик, О -ер ости Е -ер усти	319 109 210	293 76 217	139 48 91	287 84 203	583 210 373	226 54 172	294 90 204
Мм	Худудни умумий намланиши, Н	524	509	595	497	1275	564	630
Мм	Бугланиш, Б	415	433	547	383	1065	510	540
Км ³	Ёгиллар, Е	7165	32690	20780	13910	29355	6405	110305
Км ³	Дарё оқими: - тулик, О -ер ости Е -ер усти Е	3110 1065 2045	13190 3410 9780	4225 1465 2760	5960 1740 3720	10380 3740 7140	1965 465 1500	38830 11885 26945
Км ³	Худудни умумий намланиши, Н	5120	22910	18020	9690	22715	4905	83360
Км ³	Бугланиш, Б	4055	19500	16555	7950	18975	4440	71475
Нисбий микдорлари								
Дарёларга окиб келаётган ер ости сув оқими %да тулик микдоридан		34	26	35	32	36	24	31
Дарёни ер ости сувлари билан таъминланиш коэффициент		0.21	0.15	0.08	0.18	0.20	0.10	0.14
Сув оқим коэффициенти Ко		0.43	0.43	0.23	0.31	0.35	0.31	0.36

Дунёнинг чучук сув ресурслари

- Чучук сувлар табиатда сувнинг айланиши турайли йилига 41000 км^3 га якин хажмда янгиланади ёки дарёлар узанидаги сувлар микдорига нисбатан 33 марта ортик хажмга эгадир.
- Чучук сувлар планета ахолисини, хайвонот ва усимлик дунёсини хамда тупрок намлигини таъминловчи асосий манбадир.