

**MAVZU:  
TEKISLIKTENGLAMALARI VA  
ULARNI YASASH  
TEKISLIKKA DOIR ASOSIY  
MASALALAR**

# Reja:

- 1. Tekislik tenglamalari va ularni yasash**
- 2. Tekislikka doir asosiy masalalar**

I. Faraz qilaylik,  $x, y, z$  – ixtiyoriy o‘zgaruvchi miqdorlar bo‘lsin. Agar

$$F(x, y, z) = 0 \quad (1)$$

tenglik  $x, y, z$  larning faqat ayrim qiymatlaridagina o‘rinli bo‘lsa, u holda (1) ni

$x, y, z$  larga nisbatan tenglama deb ataymiz. Uchta son  $x = x_0, y = y_0, z = z_0$  (1)

tenglamani qanoatlantiradi deymiz, agar (1) dagi noma‘lumlar o‘rniga shu sonlarni qo‘yganda tenglik ayniyatga aylansa. (1) tenglamani qanoatlantiradigan har bir

$x_0, y_0, z_0$  sonlar uchligiga fazoning  $M(x_0, y_0, z_0)$  nuqtasini mos qo‘yamiz. Bunday nuqtalarning geometrik o‘rnini **sirt** deb ataymiz, **(1) ni esa shu sirtning tenglamasi** deymiz.

Agar sirt tenglamasi berilgan bo‘lib, biror nuqtaning shu sirtga yotish yoki yotmasligini tekshirish talab qilingan bo‘lsa, u holda berilgan nuqtaning koordinatalarini tenglamaning noma‘umlari o‘rniga qo‘yish kifoya. Analitik geometriyaning vazifasi qaralayotgan sirtning uning tenglamasi yordamida o‘rganishdir.

Sirtning ixtiyoriy  $M(x, y, z)$  nuqtasi uning **siljuvchi nuqtasi** deb ataladi.

Misol sifatida sferaning tenglamasini tuzaylik. Sferaning ta'rifiga ko'ra, sferaning markazi deb ataluvchi  $C(a, b, c)$  nuqtadan sferaning siljuvchi nuqtasi orasidagi masofa  $r$  o'zgarmasdir. Demak,

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} = r$$

yoki

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

Agar sferaning markazi koordinatalar boshida bo'lsa, u holda

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

Fazodagi analitik geometriyada asosan algebraik tenglamalar bilan ifodalangan sirtlar o'rganiladi. Masalan, tenglamasi

$$Ax + By + Cz + D = 0 \tag{2}$$

ko'rinishda bo'lgan sirt **1-tartibli sirt** deb ataladi. Tenglamasi

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz + 2Gx + 2Hy + 2Kz + L = 0 \tag{3}$$

bo'lgan sirtlarni **2-tartibli sirtlar** deb ataymiz. Yuqorida ko'rilgan misoldan sfera 2-tartibli sirt ekanligi kelib chiqadi.

**II. 1-teorema.** Dekart koordinatalar sistemasida tekislik 1-tartibli sirtidir.

**Isboti.** Biror dekart koordinatalar sistemasida berilgan  $\alpha$  tekisligida uning biror nuqtasi  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  va unga perpendikulyar o'tgan qandaydir  $\vec{n} = \{A, B, C\}$  vektor berilgan bo'lsin. Faraz qilaylik,  $M(x, y, z)$  tekislikning siljuvchi nuqtasi bo'lsin. Bu nuqta  $\alpha$  tekisligida yotishi uchun  $\overline{M_0M}$

vektor  $\vec{n}$  ga perpendikulyar bo'lishi shart, ya'ni  $\vec{n} \perp \overline{M_0M}$ .

Vektorlarning perpendikulyarlik shartidan  $\overline{M_0M} \circ \vec{n} = 0$  yoki

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (4)$$

kelib chiqadi. Agar  $M(x, y, z)$  nuqta  $\alpha$  tekisligida yotmasa, (4) o'rinli bo'lmaydi,

shu sababli (4) tenglik  $M(x, y, z)$  nuqtaning o'rnini to'la aniqlaydi. Agar (4) dagi qavslarni ochib va  $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$  deb belgilasak,

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

hosil bo'ladi. Teorema isbot bo'ldi.

Tekislikka perpendikulyar bo'lgan nol bo'lmagan har qanday vektor tekislikning **normal vektori** deb ataladi. Shu sababli, (4) tenglama normal vektori  $\vec{n}$  bo'lgan va  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  nuqtadan o'tgan **tekislik tenglamasini** ifodalaydi.

**2-teorema.** Dekart koordinatalar sistemasida har qanday 1-tartibli tenglama tekislikni aniqlaydi.

**Isboti.** Biror dekart koordinatalar sistemasida (2) tenglama berilgan bo'lsin. Faraz qilaylik,  $x_0, y_0, z_0$  lar shu tenglamaning biror yechimi bo'lsin, ya'ni (2)ni qanoatlantiruvchi sonlar bo'lsin. U holda

$$A x_0 + B y_0 + C z_0 + D = 0 \quad (6)$$

bo'ladi. (2) dan (6) ni ayirsak

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

hosil bo'ladi. Ma'lumki, bu tenglama normal vektori  $\vec{n}$  bo'lib,  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  nuqtadan o'tgan tekislik tenglamasidir. (4) tenglama (2) ga ekvivalent bo'lgani uchun (2) ham  $a$  tekislikning tenglamasi bo'ladi. Teorema isbot bo'ldi.

Tekislikning (2) tenglamasini uning umumiy tenglamasi deb ataymiz.

**Misol.**  $\vec{n} = \{2, 2, 3\}$  vektorga perpendikulyar bo'lib,  $M_0(1, 1, 1)$  nuqtadan o'tgan tekislik tenglamasi tuzilsin.

**Yechish.** (4) ga asosan

$$2(x - 1) + 2(y - 1) + 3(z - 1) = 0$$

yoki

$$2x + 2y + 3z - 7 = 0$$

**3-teorema.** Agar ikki  $A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 z_0 + D_1 = 0$  va  $A_2 x_0 + B_2 y_0 + C_2 z_0 + D_2 = 0$  tenglamalar bir tekislikni ifodalasa, u holda bu tenglamalarning mos koeffitsiyentlari o‘zaro proporsional bo‘ladi.

**Isboti.** Haqiqatan, agar teorema sharti o‘rinli bo‘lsa, u holda  $\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}$  va  $\vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$  vektorlar berilgan tekislikka perpendikulyar bo‘lishadi, demak, ular o‘zaro kolleniar. Vektorlarning kolleniarlik shartiga ko‘ra,  $A_2, B_2, C_2$  sonlar  $A_1, B_1, C_1$  sonlarga proporsional bo‘ladi. Agar proporsionallik koeffitsiyentini  $\mu$  desak,  $A_2 = A_1 \mu, B_2 = B_1 \mu, C_2 = C_1 \mu$ . Agar  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  tekislikning ixtiyoriy nuqtasi bo‘lsa, u holda uning koordinatalari har bir tenglamani qanoatlantiradi, ya’ni  $A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 z_0 + D_1 = 0$  va  $A_2 x_0 + B_2 y_0 + C_2 z_0 + D_2 = 0$  bo‘ladi. Agar ularning birini  $\mu$  ga ko‘paytirib, ikkinchisidan ayirsak  $D_2 - D_1 \mu = 0$  hosil bo‘ladi. Bundan esa,

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{B_2}{B_1} = \frac{C_2}{C_1} = \frac{D_2}{D_1} = \mu$$

kelib chiqadi.



**III.** Ma'lumki,  $A, B, C, D$  koeffitsiyentlar bir vaqtda nolga teng bo'lmaydi. (2) tenglamada bu koeffitsiyentlarning ayrimlari nolga teng bo'lgan bir necha xususiy hollarni ko'rib chiqaylik.

- 1)  $D=0$ ; tenglama  $Ax + By + Cz = 0$  ko'rinishga keladi. Bu tenglamani  $x=0, y=0, z=0$  sonlar qanoatlantiradi, ya'ni tekislik koordinatalar boshidan o'tadi.
- 2)  $C=0$ ; tenglama  $Ax + By + D = 0$  ko'rinishda bo'ladi. Bu tekislikning normal vektori  $\vec{n} = \{A, B, 0\}$ ,  $z$  o'qiga perpendikulyar, demak, tekislikni o'zi shu o'qga parallel o'tadi.
- 3)  $B=0, C=0$ ; bunda  $Ax + D = 0$  ga ega bo'lamiz. Uning normal vektori  $\vec{n} = \{A, 0, 0\}$   $y$  va  $z$  o'qlariga perpendikulyar, u holda tekislik  $Oyz$  tekisligiga parallel o'tadi. Xususan, agar

$D=0$  bo'lsa,  $x=0$  hosil bo'lib, bu tekislik  $O y z$  koordinatalar tekisligi bilan ustma-ust tushishiga ishonch hosil qilamiz.

Yuqoridagidek fikr yuritib,  $Ax+Cz+D=0$  tenglama  $y$  o'qiga parallel tekislikni,  $By+Cz+D=0$  tenglama  $x$  o'qiga parallel tekislikni aniqlashiga ishonch hosil qilamiz. Bularning xususiy holi sifatida,  $y=0$  tenglama  $O x z$  koordintalar tekisligining,  $z=0$  esa  $O x y$  tekisligining tenglamasi ekanligini ko'ramiz.

1)  $A, B, C, D$  koeffitsiyentlarning birortasi ham nolga teng bo'lmasin. U holda ozod hadni tenglikning o'ng tomoniga o'tkazib, tenglamani  $-D$  ga bo'lib yuboramiz:

$$\frac{Ax}{-D} + \frac{By}{-D} + \frac{Cz}{-D} = 1$$

yoki

$$\frac{x}{-D/A} + \frac{y}{-D/B} + \frac{z}{-D/C} = 1$$

Agar  $a = -\frac{D}{A}$ ,  $b = -\frac{D}{B}$ ,  $c = -\frac{D}{C}$  belgilashlar kiritsak,


$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (6)$$

hosil bo'ladi. (6) tenglamani tekislikning kesmalardagi tenglamasi deb atashadi.

**IV.** Faraz qilaylik, bizga  $\pi$  tekisligi, uning normal  $\vec{n}$  va koordinatalar boshidan tekislikkacha bo'lgan masofa  $p$  berilgan bo'lsin.  $\vec{n}$  vektorning koordinata o'qlari bilan tashkil etgan burchaklari  $\alpha, \beta, \gamma$  bo'lsin. Agar  $\vec{n}_0, \vec{n}$  vektorning orti bo'lsa, u holda

$$\vec{n}_0 = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$$

bo'ladi. Tekislikning siljuvchi nuqtasini  $M(x, y, z)$  desak, uning radius-vektori  $\overrightarrow{OM} = \{x, y, z\}$  bo'ladi. Chizmadan ko'rinadiki,  $n p_{\vec{n}_0} \overrightarrow{OM} = p$



Ma'lumki,

$$n p_{\vec{n}_0} \overrightarrow{OM} = |\vec{n}_0| \cdot n p_{\vec{n}_0} \overrightarrow{OM} = \vec{n}_0 \circ \overrightarrow{OM} = x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma$$

Bundan,

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0 \quad (7)$$

(7) tenglama **tekislikning normal tenglamasi** deyiladi.

Agar tekislikning tenglamasi (2) ko'rinishda berilgan bo'lsa, uni normal tenglamami yoki yo'qmi ekanligini


$$\mu = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \quad (8)$$

ifodaning qiymatiga qarab aniqlaymiz: agar  $\mu=1$  bo'lsa, (3) normal tenglama bo'ladi, aks holda (3) ni  $\pm \mu$  ga bo'lib

$$\pm \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} x \pm \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} y \pm \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} z \mp \frac{D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = 0 \quad (9)$$

hosil qilamiz. Bu tenglama normal bo'lishi uchun endi (9) dagi ishoralardan birini ozod had  $D$  ning ishorasiga teskari qilib olinsa kifoya. (2) tenglama  $\mu$  ifoda yordamida normal ko'rinishga keltirilgani uchun  $\frac{1}{\mu}$  ni normallovchi ko'paytuvchi deb ataladi.

**V. Nuqtadan berilgan tekislikkacha bo'lgan masofa.** Faraz qilaylik,  $\pi$  tekislik va unda yotmagan biror  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  nuqta berilgan bo'lsin.  $M_0$  nuqtadan  $\pi$  tekislikkacha bo'lgan  $d$  masofani topish talab qilingan bo'lsin. Berilgan tekislikning normali  $\vec{n}_0$  ni qurib olamiz. Agar  $M_0$  nuqta va koordinatalar boshi  $\pi$  tekislikning har xil tomonlarida joylashgan bo'lsa, u holda  $M_0$  nuqtaning  $\pi$  tekislikdan chetlanishi deb  $+d$  ga, aks holda  $-d$  ga aytamiz.



$M_0$  nuqtani normalga proyeksiyalaylik. U holda chizmadan ko‘rinadiki,

$$\delta = PQ = OQ - OP$$

$$OP = p, \quad OQ = n p_{\vec{n}_0} \overrightarrow{OM}$$

ekanligini e‘tiborga olsak,

$$\delta = n p_{\vec{n}_0} \overrightarrow{OM} - p$$


$$n p_{\vec{n}_0} \overrightarrow{OM} = x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma$$

bo'lgani uchun

$$\delta = x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma - p \quad (10)$$

formulaga ega bo'lamiz. U holda

$$d = |x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma - p|$$



**VI. Ikki tekislik orasidagi burchak.** Faraz qilaylik, bizga

$\Delta_1 : A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0$  va  $\Delta_2 : A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0$  tekisliklar berilgan bo'lsin.

$\vec{N}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}$  va  $\vec{N}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$  berilgan tekisliklarning normal vektorlari.

Chizmadan ko'rinadiki, tekisliklar orasidagi burchak ularning normallari orasidagi burchakka teng. Shuning uchun normal vektorlar orasidagi burchakni qidiramiz.

Ma'lumki,

$$\cos \varphi = \frac{\vec{N}_1 \circ \vec{N}_2}{|\vec{N}_1| \cdot |\vec{N}_2|}$$

yoki

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \quad (11)$$

Agar  $\Delta_1 \perp \Delta_2$  bo'lsa,  $\varphi = \frac{\pi}{2}$  bo'ladi. U holda  $\cos \varphi = 0$  va (11)ga asosan

$A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$ . Bu tenglikni tekisliklarning perpendikulyarlik sharti deb atashadi.

Agar  $\Delta_1$  tekislik  $\Delta_2$  tekislikka parallel bo'lsa, u holda  $\vec{N}_1$  vektor  $\vec{N}_2$  vektorga kolleniar bo'ladi. Vektorlarning kolleniarlik shartiga ko'ra

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

bo'ladi. Bu munosabat tekisliklarning parallellik sharti deb ataladi.



**VII. Uch nuqtadan o'tgan tekislik tenglamasi.** Bizga  $\Delta$  tekislikning uchta  $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ,  $M_2(x_2, y_2, z_2)$ ,  $M_3(x_3, y_3, z_3)$  nuqtasi berilgan bo'lsin. Agar  $M(x, y, z)$  shu tekislikning siljuvchi nuqtasi bo'lsa, u holda  $\overrightarrow{M_1M}$ ,  $\overrightarrow{M_1M_2}$ ,  $\overrightarrow{M_1M_3}$  vektorlar  $\Delta$  tekislikda yotadi, ya'ni ular komplanar bo'ladi.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{M_1M} &= \{x - x_1, y - y_1, z - z_1\}, \\ \overrightarrow{M_1M_2} &= \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}, \\ \overrightarrow{M_1M_3} &= \{x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1\}\end{aligned}$$

ekanligidan va vektorlarning komplanarlik shartidan

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

kelib chiqadi.

1. Азларов Т., Мансуров Х., Математик анализ, Т.: «Ўқитувчи». 1 т: 1994 й.
2. Азларов Т., Мансуров Х., Математик анализ, Т.: «Ўқитувчи». 2 т: 1995 й.
3. Аюпов Ш.А., Бердиқулов М.А., Функциялар назарияси, Т.: “ЎАЖБНТ” маркази, 2004 й.
4. Turgunbayev R., Matematik analiz. 2-qism, T.TDPU, 2008 y.
5. Jo'raev T. va boshqalar, Oliy matematika asoslari. 2-q., T.: «O'zbekiston». 1999
6. Саъдуллаев А. ва бошқ. Математик анализ курсидан мисол ва масалалар тўплами, III қисм. Т.: «Ўзбекистон», 2000 й.,
7. Соатов Ё., Олий математика. Т., “Ўзбекистон”. 1996 й, 3 жилд
8. [www.ziyonet.uz/](http://www.ziyonet.uz/)
9. [www.pedagog.uz/](http://www.pedagog.uz/)



TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ  
XO'JALIGINI MEXANIZATSIYALASH  
MUHANDISLARI INSTITUTI



**E'TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT**



+ 998 71 237 09 86