



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ ИРИГАЦИЯ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ  
МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУҲАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИ**



**“ҚИШЛОҚ ВА СУВ  
ХЎЖАЛИГИНИНГ  
ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ”**

маеъусидаги ажъанавий **XX** - ёш  
олимлар, магистрантлар ва  
иқтидорли талабаларниң илмий  
- амалий анҷумани

**20**

**XX - traditional Republic  
scientific - practical conference of  
young scientists, master students  
and talented students under the  
topic**

**“THE MODERN PROBLEMS OF  
AGRICULTURE AND WATER  
REOURCES”**

**ТАКЛИФНОМА – ДАСТУР**

Тошкент – 2021 йил, 25-26 май

## II ШЎЬБА

### Сув ресурсларини бошқариш, экология ва атроф мухит муҳофазасида рақамлаштириш

Раис: проф. Эгамбердиев Н.

Хамраис: доц. Бойиров Р.

Котиб: док. Хакимова П.

№	Муаллифлар	Мақола номи	Изоҳ
1.	Юлдошова З. - магистр, Ўзбекистан Миллий университети Ubaydullayev S.-3 bosqich talaba	Гарбий зарафшон тизмаси тогларидан оқиб тушадиган соёлар оқимининг йиллараро ўзгариши.	
2.	Tursunov I. - stajor-o'qtuvchi, TIQXMMI Buxoro filiali Nazarov Sh. - 1-bosqich talaba, O'zbekova G. - o'qtuvch, TIQXMMI Qarshi filiali	Hozirgi global iqlim o'zgarishlari sharoitida suv resurslarining holati.	
3.	Алимова М. - мустакил 4. тадқиқотчи, Эгамбердиев Н. - профессор, ТИҚҲММИ Мўминов У. - талаба,	Suv resurslaridan foydalananish va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashning ahamiyati.	
5.	Каримов Н. - ассистент, ТИҚҲММИ Қарши филиали	Қибрай пивозаводи оқава сувларини биотехнологик тозалашни ўрганиш.	
6.	Баратов Д. - ассистент, ТИҚҲММИ Қарши филиали Бердиева Н. - 1 bosqich магистр, Исаева Л. - докторант, ТИҚҲММИ Бухоро филиали	Қашқадарё ҳавзаси дарёлари оқимининг йиллараро ўзгаришини баҳолаш масалалари.	
7.	Ҳамроев О. - 1 bosqich магистр, Муродов О. - стажёр-ассистент, ТИҚҲММИ Бухоро филиали Бердиева Н. - 1 bosqich магистр, Исаева Л. - докторант, ТИҚҲММИ Бухоро филиали	Таълим жараённада талабаларнинг ташкилотчилик кобилиятларини ривожлантириш муаммолари.	
8.	Абдуқодирова М. -1 bosqich магистр, Истроилов И. -1 bosqich magistr, Фозилжонова Н.- ТИҚҲММИ Abduqodirova K.-talaba,	Бухоро вилояти шароитida маккажӯхори навларини кучсиз шўрланган срларда стиштириш агротехникиси.	
9.	10. Abduqodirova M.- magistr, Istroilov I.-magistr, ТИҚҲММИ Абдураимов А. - студент 3-	Тариқ экинини стиштиришда ер ости сувларидан фойдаланиши самарадорлигини аниқлаш.	
11.	12. Abduqodirova M.- magistr, Istroilov I.-magistr, ТИҚҲММИ Абдураимов А. - студент 3- курса Турсунбоев Л. - 1 курс	Асосий экин сифатида маккажӯхори навларини сувтежамкор томчилатиб сугориш тартибларини ишлаб чиқиш.	
		Оқава сувларни биологик услубларда тозалаш.	
		Suv ta'minoti.	
		Применение мембранных фильтров на очистных сооружениях канализационных стоков (на примере г. Чиназа Ташкентской	

## ОҚАВА СУВЛАРНИ БИОЛОГИК УСЛУБЛАРДА ТОЗАЛАШ.

Абдуқодирова М., Исройлов И., Фозилжонова Н.

**Аннотация:** ушбу мақолада оқава сувларни турли услубларда тозалаш, яғни, биопленкалы, аэротенкалы, метантенкалы, фильтрация майдони ва бошқа турли модификатциялы сув ҳавзаларидан фойдаланган ҳолда тозалаш услублари күриб чиқилади. Оқава сувларни биологик тозалаш жараёнини тезлаштириш йўллари кўрсатиб ўтилган.

**Аннотация:** в настоящей статье рассматриваются очистка сточных вод различными способами, то есть, фильтрационные площади с биопленкой, аэротенкой, метантенкой и способы очистки с помощью водных бассейнов с различной модификацией. Также рассмотрены пути ускорения процесса биологической очистки сточных вод.

**Annotattsiya:** This article discusses the various methods of waste water treatment, that is, bioplenkali, aerotenkali, metantenkali, filtration area and a variety of other modifikattsiyali the use of bodies of water purification methods will be considered. Ways to accelerate the process of wastewater biological treatment process.

**Калит сўзлар:** тозалаш услублари, сунъий ва табиий тозалаш, биологик ҳавзалар, микроорганизмлар.

Хозирги кунда оқава сув ва сув ҳавзаларини тозалигини муҳофаза қилишга катта эътибор берилмоқда. Ер усти ва ер ости сувларини оқава сувлар таъсирида буғланишини олдини олиш мақсадида бир қанча тадбиirlар ишлаб чиқилмоқда. Оқава сувларни тозалаш масаласи ҳозирги даврда долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Фан ва адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, оқава сувларнинг тозалашнинг кўпгина услуг ва йўналишлари орасидан тадбиқ этишга лойиқлари биологик ёки кимёбиологик тозалаш методи ҳисобланади.

**Иш мақсади:** оқава сувларни биологик услугда тозалаш услубини ўрганиш.

Биологик тозалаш услуби микроорганизмлар ва сув ўсимликлари (гидробионт) иштироқида аэробли биокимёвий жараёнлар ёрдамида оқава сувларни таркиби органик минераллар билан ифлосланишини тозалашни ўз ичига олади. Биологик тозалаш сув таркибидаги микроорганизмларни йўқотади. Ушбу босқичда оқава сувлар таркибидаги органик азот ва фосфор бартараф этилиб, БПК камаяди ва минераллашиш жараёни содир бўлади. Оқава сувларнинг суюқ қисми табиий ёки сунъий услугдаги биологик тозалашга йўналтирилади. Табиий биологик тозалаш жараёни биологик ҳовузларда фильтрация майдонларида сугориш далаларида амалга оширилди. Суъний биологик тозалаш учун биологик фильтрлар аэротенкалар каби маҳсус иншоотлардан фойдаланилади. Чўкиндига маҳсус майдонларда ёки метантенкаларда ишлов берилади.

Оқава сувларни биологик услугда тозалаш жараённанда кислородга нисбатан боғлиқлигига кўра икки гурухга бўлинувчи бактериялар иштирок этади: аэроблар (сувда эриган кислород билан нафас олувчи демактир) ва анаэроблар (кислородсиз муҳитда ривожланувчилар). Анаэроб (ҳавосиз) тозалаш темир бетон идишларда амалга оширилади (метантенка, септика, икки қаватли чўкинди идиши). Бу жараёнда метан пайдо қилувчи бактериялар ёрдамида органик ифлослантирувчиларни ачитиш жараёни содир бўлади. Анаэроб тозалаш услубининг асосий камчилиги – бу биогаз (метан) ажралиб чиқишидир, натижада, ноxуш хид пайдо бўлиб санитария жиҳатдан ёмон ҳолатга ва ёнгин келтириб чиқариш ҳавфига олиб келади.

Тошкент шахри Салар тозалаш иншоотларида оқава сувларни тозалаш жараёни бир суткада 925 минг м<sup>3</sup> суюқ чўкинди хосил бўлиши маълумдир. Ҳосил бўлган чўкиндининг

хаммаси махсус герметик идишларда 53 С даражада ачитилади, натижада таркибида 65% метан бўлган биогаз ишлаб чиқарилади. Кўпгина замонавий тозалаш иншоотларининг ишлаш принципи аэроб жараёнидан фойдаланишга асосланган. Аэроб тозалаш жараёни суғориш далаларида фільтрация майдонларида биологик ҳовузларда каналларда махсус сув ўсимликлари ўстириладиган биомухандислик иншоотларида биофільтрларда махсус идишларда –Аэротенкаларда амалга оширилади. Алоҳида кувур тизимини қуриш учун биофільтрлар ёки аэротенкалар қулайдир. Бу тизимларда микроорганизмларнинг ҳаётий ривожланиши тезлашиши содир бўлиши учун сунъий шароитлар яратилади. Бу тизимнинг ишлаш принципи нималардан иборат, бу нима билан бир биридан фарқ қилишини батавсил кўриб чиқамиз: биологик қурилмаларнинг бир қанча турлари мавжуд; биологик фільтрлар (юпқа бактериал плёнка, иш ҳаракат бошланишини ифодалайди) биологик ҳовузлар (оқава сувни тозалашда, сув ҳавзасини барча бирикмалари иштирок этади) ва аэротенкалар (фаол чўкиндили фаол аэротацияли улкан темирбетон резервуерлар).

Тозаловчи бошланғич аэротенкалар-бу бактерия ва микроскопик организмлар билан фаоллаштирилган чўкиндидир. Фаоллаштирилган чўкиндидида микроорганизмларни тезда ривожланишига ва озуқа манбаси бўлиб хизмат қилишга тозалаш иншоатига таркибида кислород кўп бўлган ҳаво оқими ёрдамида келаётган органик моддалар билан ифлосланган оқава сувнинг хизмати катта. Бактериялар бир-бирига ёпишган холда ферментлар ажратса бошлайди, бу органик ифлосланишни минераллаштиради. Чўкма тозаланган сувдан ажралган холда бактериялар билан бирга тез сув тубига чўқади. Майда микроорганизмлар (инфузория туфелка, амёба, каловратка) бактерияларнинг озиқланиши натижасида чўкма таркибидаги бактериялар массасини камайишига олиб келади. Шуни таъкидлаш керакки, чўкинди оқава сув билан аралашгач бир неча дақиқадан сўнг, оқава сув таркибидаги органик моддалар концентрацияси яримидан кўпроқ қисмга камаяди. Умуман олганда, сув таркибидаги органик моддалар ҳажми аэротенка орқали ўтгач 90% га камаяди. Табиий шароитларда оқава сувларни биологик услубда кўшимча тозалаш учун биологик ҳовузлар ва суғориш далалари ёки фільтрация майдонларидан фойдаланилади. Биологик ҳовузлар – бу табиий сув ҳавзаларида каби, ўз ўзидан тозаланиш жараёни кечадиган, сұйний равишда ерга қазилган саёз резервуарлардир. Улар 6 С даражадан паст бўлмаган ҳароратда ишлайди. Одатда, уларни 4-6 бўлимдан иборат қилиб, қийиқликларда кавланади. Ҳовузлар зинапоя шаклида жойлашиши, сувнинг тепадан пастки ҳовузларга ўз ўзидан оқиб тушишига сабаб бўлади.

Сувнинг таркибида аммоний ионларини юқори миқдорда бўлиши сувни биологик барқарорликка олиб келади, хлорлашга қарамай, сувни чиқариш жойларда биологик нитрофикация жараёни жадаллашади, у ерда қувурларнинг занглаши ҳамда сувда ноҳуш хид ва таъм пайдо бўлиши кузатилади. Биологик ҳовузда бўлган вактда сувда эримайдиган кўрғошин, кадмий, темир ва марганетс чўкиндилари анча миқдорда камаяди. Сув таркибида куйидаги ўлчанган моддалар йўқ қилингани белгиланади: мис, симоб, хром, нефт маҳсулотлари концентрациясини 5-10 баробар камайгани, фекал Е-соли бактерияларини деярли барчаси (99%). Умумий бактериялар ифлосланиши 99% га камайгани оксидланиши 40-50% ҳамда органик углеродни камайиши белгиланади. Сувнинг биологик ҳовузларда бўлиши уни келиб чиқиши табиий ва сунъий бўлган турли гурухларга мансуб органик моддалар билан микроифлосланишини анча камайтиради. Демак, бу парланиш, шимилиш ва чўкиш, сув ўсимликлари таъсирида биопарчаланиш жараёнида содир бўлади.

Концерген ва мутаген хусусиятларига эга бўлган хушбўй, юқори сифатли углеводородларни ва сон жихатидан камайиши кузатилмоқда (уларнинг сони 54 тадан 2тага камайган, умумий концентрацияси эса 13 баробарга камайган). Стероидлар ва феноллар группаси ёрдамида тамоман йўқ қилишга (80%-90%) эришилади. Ишлаб чиқаришда

пластификатор сифатида фойдаланиладиган мураккаб эфирлар, асосий фтоладлар ва фосфатлар ўзининг юқори биологик устуворлиги билан сувдан сезиларли даражада йўқотилади. Ёғли кислоталар (полмитен, стеарин) кўпгина микроорганизмларнинг ҳаёти тарзида асосий озуқаси бўлган учун уларнинг сувдаги концентрацияси деярли ўзгармайди. Биологик ҳовузларда сув таркибидаги кўпгина синтетик органик моддаларни етарлича миқдорда йўқотишга эришилмоқда, уларнинг кўпчлиги сувни хлорлагандага хлорорганик моддалар ва бошқа заҳарли бирикмаларни тузишади. Аммони азотни йўқотиш хлор миқдорини камайтиради, бу эса кейинчалик сувни тозалаш ишларини енгиллаштиради ва арzonлаштиради, масалан, келажакда олий сифатли ичимлик суви олиш учун реагентларга кетадиган ҳаражатларни камайтиради.

Биологик ҳовузларда сувнинг ҳарорати 6-8 С дан кам бўлса, бактериал ўз-ўзидан тозаланиш жараёни секинлашади. Тўлдирилган биологик ҳовузларда сувни тозалаш учун муҳитга мослашган сув ўтлари комплексини аралаштириш эвазига биологик ўз ўзидан тозаланиш жараёни тезлашади, эффект ошади, сувни биологик ҳовузда туриш муддати 9 суткага камаяди. Бу қисман структураси ўзгарган табиий ва антропоген органик бирикмаларга, уни кўпайтирувчи ва тезлаштирувчи биопарчаланишга олиб келади. Сувни кам вақт биологик ҳовузда бўлиши ҳам тозалаш бўйича қуидагиларни таъминлайди: хираклик бўйича 50-60%; аммонийли азот 60%; перманганетли оксидланиш – 40%; натогенли бактериялар сони бўйича 99%.

Табиий ёки сунъий аэрацияга мувофиқ ҳовузлар биологик тозалаш иншооти сифатида мустақил равишда фойдаланиш мумкун бўлган шароитда бир бири билан фарқланади. Бу холатда сунъий аэрацияли ҳовузлар учун тозалаш станциясининг ишлаб чиқариш қуввати суткасига  $15\text{ минг м}^3$  дан ортмаслиги керак, табиий аэрацияли ҳовузлар учун суткасига  $5 \text{ минг м}^3$  дан ортмаслиги керак. Агар БПК<sub>тўла</sub> оқавада кўрсаткич қиймати 200мг/л дан кам бўлса, табиий аэрация кўлланилади, кўрсаткич қиймати кўп бўлса сунъий. Оқава сув олдин панжара ва бирламчи босқичлардан ўтказилади, сўнг, тозаловчи биологик ҳовуз орқали ўтказилади. Табиий аэрацияли ҳовузларнинг ўтказиш қобиляти суткасига  $10000 \text{ м}^3$  дан ошади, сунъий аэрацияли ҳовузларнинг ўтказиш қобиляти чексиздир. Агар БПК<sub>тўла</sub> да оқава сувнинг кўрсаткич қиймати 200мг/л дан ошмаса, 5 зоналик биологик ҳовуз ишлатилади, агар БПК<sub>тўла</sub> да кўрсаткич қиймати 250 мг/л гача бўлса сунъий аэрацияли биологик ҳовуз ишлатилади. Бактериялардан сув ўтларининг фотосинтез жараённада ажрататётган ифлосланган кислородни оксидлаш ҳамда ховодан олинаётган кислородни оксидлаш учун фойдаланилади. Сув ўтлари ўз навбатида CO<sub>2</sub> ва органик моддаларни биокимёвий парчаланишидан ажралиб чиқаётган фосфатлар ва аммоний азотбни ўзлаштиради. Олимларнинг фикрига кўра, биологик ҳовузлар суний биологик тозалаш иншоотларига нисбатан оқава сувларни сифатлироқ тозалашни таъминлар экан.

Йилнинг илиқ фасилларида БПК<sub>тўла</sub> тозаланган биологик ҳовузларда оқава 5-6 мг/л гача камаяди, ўлчанган моддалрнинг салмоғи -15-30 мг/л гача. Йилнинг совук йилларида БПК<sub>тўла</sub> 3-4 мг/л гача камайиши мумкин, ўлчанган моддалар салмоғи – 10 мг/л ни ташкил этади. Биологик ҳовузларни IV климатик зона учун йил давомида эксплуататсия қилинса табиий аэрацияли ҳовузларни қўллашга руҳсат этилади. Бошқа климатик зоналарда биологик ҳовузлар асосан йилнинг илиқ фасилларида ишлайди. Биологик ҳовузлар филтрланадиган ёки заифрок филтрланадиган тупроқда жойлашиши керак. Ахоли яшайдиган пунктларга нисбатан ҳовузлар шамол эсадиган томонга жойлашади, сувнинг йўналиши ҳовузларда шамолнинг йўналишига перпендикуляр бўлиши лозим.

Ҳовузларнинг сунъий аэрацияси механик ёки пневматик бўлиши мумкин. Биринчи холатда биологик ҳовузларда понтонларга механик аэраторлар ўрнатилади, иккинчи холатда эса, ҳовуз тубига маълум шакилга эга полиэтилен қувур ётқизилади. БПК<sub>тўла</sub> 3 мг/л

гача бўлган чуқурликдаги сувни тозалаш учун ва биоген элементлар таркибини камайтириш учун ховузнинг оҳирги зонасида қамиш, шакер қамиш ва бошқа зарур сув ўсимликларини ўстириш тавсия этилади.

Биологик ховузларнинг шакли планда аэрация турига қараб қабул қилинади: тўғрибурчакли (агар пневматик ва меҳаник аэрация бўлса) ва айланали (планетар аэрация бўлса) биологик ховузлардаги зоналарнинг узунлиги ва кенглиги ўртасидаги фарқ, агар табиий аэрация бўлса 20-30 ва ундан кўпроқ, агар суний аэрация бўлса, 1-3 дан кўп бўлмаган ҳолда қабул қилинади. Табиий аэрацияли ховузларнинг гидравлик чуқурлиги 0.5-1 м гача бўлади. Ховуз қуриш ҳисоб китоб ишларида оқава сувнинг ховузда туриш давомийлиги таминланиши учун унинг ҳажмлари аниқланади. Ҳисоб асосини оксидланиш тезлигини аниқлаш ташкил қиласди, у БПК бўйича баҳоланади ва секин парчаланадиган моддалар қабул қилинади. Оқава сувларни тозлаш биологик методнинг турли генезислари экологик тоза ва иқтисодий тежамкордир. сунъий биологик тозалаш эса бунинг аксиdir. Биологик методлар инсон саломатлиги ва хаёт тарзини яхшилашга олиб келади, яшаш шароит ва ҳайвонот дунёсини экологик тоза ҳолатда сақлаб қолади.

Табиий ва сунъий аэрацияли биологик ховузлар бу иқтисодий тежамкор оддий ва ишончли иншоот ҳисобланади. Буларда органик моддалар 5 мг/л гача биоген элементлар таркиби ва бактериал ифлосланишнинг камайиш жараёни содир бўлади. Ер майдонларининг бўлмаганлиги биологик ховуз қуришни иложи йўқлигига ўша жойдаги иншоотларни оқавани сунъий тозалашга мослаштириш мумкин. Филтрация майдонлари оқава сувни фақат биологик тозалаш учун мўлжалланган. Суғориш далаларида сувни тозалаш билан бирга қишлоқ ҳўжалиги маҳсулотлари ҳам етиштирилади. Катта ва кичик шаҳарларда ҳўжалик ва ишлаб чиқариш корхоналарида ишлатилган оқава сувлар тозалаш учун аэрация станцияларига жўнатилиади.

Қишлоқ ҳўжалигига чорвачилик комплексидан чиқкан оқава сувларни тозалаш дала суғоришида ишлатиш катта муаммодир. Юқори концентрацияли оқава сувни суғориши далаларига беришдан олдин биологик ховузларда тозаланиб заарсизлантирилади. Чорвачилик оқава сувлари билан дехқончилик далалари суғорилганда очиқ сув ҳавзалари кўриқлов чегарасидан 300м, аҳоли яшаш жойидан 500 м узоқликда ҳамда сизот сувлари ер сатҳидан 1.5 м чуқурликда бўлиши керак. Суғориладиган ерларга 30 м кенгликда ўрмон дараҳтлари ҳам экилиши мумкин.

Маълум шароитда тозаланадиган сувни тозалаш схемаси аниқланади, яъни, сувдаги аралашмани қайта фойдаланиш ва тозаланган сувни ишлаб чиқариш корхонаси эҳтиёжига қайта жўнатиш шунинг жумласидандир. Махсус талабларга риоя қилган ҳолда, истисно сифатида, оқава сувлари ва хавфли чиқиндилар учун ер ажратилади. Кичик шаҳарча микрорайон меҳмонхона қишлоқ аҳоли пункти каби жойларга кичик нормада сув ажратилади текшириш тавсилотлари шуни кўрсатадики, бундай обектлардан чиқаётган оқава сувларнинг ифлосланиш концентрацияси БПК бўйича 70 дан 150 мг/л ни ташкил этади. Бу ҳолда аэротенка нормал режасида ишлай олмайди. Фаол чўкма майдада пахтага айланиб чўкинди чўкиш жойига яхши чўкмайди, оқибатда тозалаш иншоотидан олиб чиқиб ташланади. Паст концентрацияли оқава сувни тозалашда аэротенкадаги фаол чўкманинг кўпайиши иккиламчи чўкинди чўкиш зонасидан чиқаётгани билан баробардир. Шунинг учун, фаол чўкмада берилиган концентрацияни сақлаб туриши жуда мураккабдир, асосан номутаносиб оқава сувнинг оқими келиб турганда 1 грамм фаол чўкмага БПК бўйича 30мг органик зўриқиши берилганда оксидланиш хусусияти йўқолиб боради.

Аэротенкада осилган ҳолатдаги аэроб ва анаэроб микроорганизмлари биологик тозалаш системасидан тезда ювилиб кетиши ҳаммага маълум. Шу тариқа сунъий биологик тозалаш иншоотини ишлатиш шуни кўрсатадики ҳар ҳил қувватли тозалаш қурилмалари

юқори агроминерал ифлосланишни эффект ва доимий тозалай олмайды. Тозалаш иншоотларида барқарор тезлаштирилган жараёнда ишлайдиган биологик тозалаш қурилмаси учун янги технология таклиф қилинди. Бу ишлаб чиқариш ва коммунал оқава сувларини тозалайдиган аэротенкага ёпишган қайта яроқли ҳолга келтирадиган микрофлорали қурилмадир. Битта қурилмага жойлашган микрофлоралар уйғунлиги турли гурухдаги микроорганизмларнинг ҳаёти учун оптималь шароит яратилади. Шу аснода фаол чўқманинг концентрацияси 3-6 баробарга ошди, оксидланиш куввати 2-3 маротаба кўпайди, оқава сувининг аэрация вақти 1.5-2 баробарга камайди. Бу устунлик чўкиндини юқори дозасини таъминлаб туриш муҳим бўлган жойда юқори концентрацияли оқава сувларга ишлов беришда муҳим роль ўйнайди. Бундай йўл билан оқава сувни биологик усулда тозалаш табиий ҳолатдаги сувга салбий таъсирини тамоман камайтиради, шунингдек, атроф-муҳитга таъсир этмайди, яъни, бизда оқава сувни шундай услуги борки, сув мисоли хомашё, энергия ҳамда ресурс сифатида самарали, комплекс равишда фойдаланилади.

### **Адабиётлар рўйхати**

1. Яковлев С.В. “Биологическая очистка производственных сточных вод”. - М.:Стройиздат, 1985.-208с
2. Яковлев С.В. и др. Водоотводящие системы промышленных предприятий. М.: Стройиздат, 1990.
3. Ласков Ю.М, Воронов Ю.В. “Примеры расчетов канализационных сооружений”. М.: Стройиздат.1987.-255стр.
4. Воронов Ю.В., Яковлев С.В. «Водоотведение и очистка сточных вод» МГСУ Издательство Ассоциации Строительных вузов, Москва 2006.-704с.
5. Черкинский С.Н. Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы. М.: Стройиздат, 1982.
- 6.Хамидова Х.М. Развитие микробиологии и микробной биотехнологии Материалы Международного симпозиума Микроорганизмы и биосфера Ташкент: 2015 с 3-6
- 7.Djalilova A.Ю., Xamidov A.O., Abduqodirova M.H. «Kanalizatsiya va oqova suvlarni tozalash» fanidan o'quv qo'llanma. Toshkent – 2012 y -200 bet

UDK 628.1.033 (575.1)